

## Tratamiento



El tratamiento de la tuberculosis se realiza con combinaciones de fármacos antituberculosos, haciendo eficaces las pautas de 10 meses de tratamiento (el tiempo y los medicamentos deben ser una decisión de su médico).

La tuberculosis es curable, pero es necesario un diagnóstico temprano (acudir inmediatamente al médico), pues si no se sigue el tratamiento adecuado puede convertirse en una enfermedad grave.

De no tratarse de forma adecuada y oportuna, se estima que un 50% de quienes la padecen podrían fallecer dentro de los 5 años siguientes al inicio de la enfermedad, mientras el 50% restante crea resistencia a los fármacos, lo que hace más difícil su recuperación.



## SUCURSALES

### Oficina Principal:

C/ Jose Amado Soler No.16,  
Esquina Plaza Alcalá,  
Ensanche Serrallés,  
República Dominicana.  
Tel: 809-472-3999

### Sucursal Higüey:

Av. José A. Santana, N° 26, 2do. Nivel  
Plaza Rodríguez, Local No. 8  
Higüey, República Dominicana.  
Tel: 809-746-0454

### Sucursal Baní:

Calle Presidente Billini,  
Esquina Calle Mella, Edificio 2 B,  
2do Nivel, Plaza Valera Guzmán, Baní  
República Dominicana.  
Tel: 809-522-8877.

### Sucursal San Francisco:

C/ 27 de Febrero No.45,  
Local Comercial No. 6-A,  
Plaza Platinum,  
San Francisco de Macorís,  
República Dominicana.  
Tel: 809-290-6211

## STANDS DE SERVICIOS

### Stand Centro

#### Médico Dominicano:

C/ Luis F. Thomen  
No. 456, El Millón.  
Santo Domingo,  
República Dominicana.  
Tel: 809-518-2417.

### Stand Clínica Corominas:

Calle Restauración N° 57  
Clínica Corominas  
3era Planta Santiago,  
República Dominicana.  
Tel: 809-580-1977 Fax: 809-582-9336

### Stand Hospital

#### El Buen Samaritano:

C/Circunvalación #79,  
Altos de Villa Verde, La Romana,  
República Dominicana.  
Tel: 809-756-9493

### Stand Centro Médico Bournigal:

C/ Antera Mota, Esq. C/Dr. Zafra  
Puerto Plata, República Dominicana.  
Tel: 809-261-0922.

### Stand Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat):

C/Pepillo Salcedo, Esq. Arturo Logroño,  
Ensanche la Fé Santo Domingo,  
República Dominicana.  
Tel: 809-547-1381.



**TELEASISTANET:**  
**(809) 472-3999**

Autorizaciones Automáticas: Opción 7  
Autorizaciones Médicas: Opción 6

**DESDE EL INTERIOR SIN CARGOS:**

**Autorizaciones automáticas:**  
**(809)200-0751**

**Autorizaciones Médicas:**  
**(809)200-6900**



# Tuberculosis

PLAN de Salud  
Básico

PLAN  
Classic-I

PLAN  
Classic-II

PLAN  
Classic-III

PLAN  
Premium

PLAN  
Cron



Promoción y Prevención

[www.arsasistanet.com](http://www.arsasistanet.com) @arsasistanet ARS ASISTANET

## Tuberculosis



La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que se manifiesta con tos persistente, expectoraciones de sangre, pérdida de peso y fiebre. Generalmente, el daño es en los pulmones hasta en un 85% de los casos; en menor medida se presenta en forma renal, ganglionar, intestinal y ósea (en los huesos).

La transmisión de la tuberculosis solo puede ocurrir de unas personas que tengan activa la enfermedad y se produce a través de partículas expelidas por el paciente bacilífero (con TBC activa) con tos, estornudo, hablando, cantando, etc. Un paciente con tuberculosis activa, sin tratamiento, puede infectar de 10 a 15 personas por año.

Otros riesgos incluyen aquellas áreas donde la tuberculosis es frecuente; en pacientes inmunodeprimidos con condiciones como malnutrición y SIDA, poblaciones étnicas en alto riesgo y trabajadores de la salud sirviendo en regiones de alto riesgo. En los pacientes con SIDA la tuberculosis actúa como enfermedad oportunista. También puede transmitirse por vía digestiva, sobre todo al ingerir leche no higienizada, procedente de vacas tuberculosas infectadas con *Mycobacterium bovis*.

## ¿Qué se debe hacer en caso de tuberculosis?



La cadena de transmisión puede romperse si se aísla al enfermo con tuberculosis activa y se comienza de inmediato la terapia antituberculosis efectiva. Después de dos semanas con dicho tratamiento, aquellos pacientes con tuberculosis activa y no resistente dejan de ser contagiosos.


Si una persona llegase a quedar infectada, le tomará 21 días a un mes antes de que pueda comenzar a transmitir la enfermedad a otros. La visión de la enfermedad y la salud deben situarse en el amplio contexto de existencia humana.

## Podemos Afirmar que:



- Los individuos con un bajo estado socioeconómicos experimentan mayor morbilidad (riesgo de enfermarse) y mortalidad que de los de alto estado.
- La incidencia de las enfermedades y la supervivencia se acortan o desaparecen cuando se controla la diferencia de estado socioeconómico.
- Los factores de riesgo conductuales desempeñan un papel principal en la etiología de la enfermedad.

## Principales Síntomas de la Tuberculosis Pulmonar



ARS  
ASISTANET

Comprometidos con tu Salud